

PRODUKTDATABLAD

Laktulose Medilax, Oral

Medilax HF er en mikstur mod forstoppelse og træg mave, som også er velegnet ved kronisk forstoppelse. Medilax indeholder laktulose og virker ved at binde vand til tarmindholdet, så det svulmer op og stimulerer tarmens naturlige bevægelser.

Medilax® (laktulose) er et afføringsmiddel, der kan benyttes ved forstoppelse. Medilax® (laktulose) kan endvidere benyttes ved Svære leversygdomme, hvor leveren ikke som normalt kan nedbryde alle de stoffer, der dannes i eller optages fra tarmen.

Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.



Ingredienser:	Laktulose og rensed vand
Indikation:	Tarmregulerende ved kronisk obstipation
Dosering:	Børn under 5 måneder: 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14 år: 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Opløsningen gives til barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger. Voksne og børn over 14 år: begyndelsesdosis 15-30 ml daglig. Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage, kan dosis fordobles. Dosis er individuel og bør justeres til halvfast afføring opnås. Kan tages uafhængigt af måltiderne.
Kontraindikationer:	Ved leversygdom bør begyndelses dosissen fastsættes til 30 – 50 ml 3 gange i døgnet, hvorefter vedligeholdelsesdosissen fastsættes individuelt. Gastrointestinal obstruktion. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis. Galactoseintolerans. Overfølsomhed over for det aktive stof.
Advarsler og forsigtighedsregler:	Medilax® (laktulose) Bør ikke indtages dagligt over længere perioder, da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Høje doser (100-150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Bør ikke anvendes til patienter med fructoseintolerans, galactoseintolerans/galactosæmi, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.
Opbevaring:	Utilgængeligt for børn og ved temperaturer under 25°C.
Holdbarhed:	Se holdbarhedsdato på emballagen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Håndtering og destruktion:	Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

PRODUKTDATABLAD

Laktulose Medilax, Oral

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7515115	Laktulose Medilax	Håndkøbsmedicin Oral HF	1000 ml	krt. a 6 stk.	063142

ANSVARLIGT FIRMA

Meda A/S, Solvang 8, DK-3450 Allerød, Denmark