

# PRODUKTDATABLAD

## Microlax

Microlax er et flydende afføringsmiddel i en plasttube. Der er et næb på tuben, som sikrer, at du kan indføre lægemidlet dybt i endetarmen.

Microlax øger vandindholdet i afføringen og gør afføringen mere blød. Microlax virker kun på afføringen i endetarmen. Det bliver ikke optaget i kroppen.



**Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.**

**Indholdsstoffer:** **Aktive stoffer:** natriumcitrat (dihydrat) og natriumlaurylsulfoacetat. 1 ml Microlax indeholder 90 mg natriumcitrat og 9 mg natriumlaurylsulfoacetat.

**Øvrige indholdsstoffer:** sorbitol (E 420) (3125 mg pr. rektaltube); glycerol (E 422); sorbinsyre (E 200) og rensset vand.

**Indikationer:** Anvendes ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation, før kikkertundersøgelse af endetarmen eller før røntgenundersøgelse af tarmen. 1 tubes indhold (5 ml) tømmes i endetarmen.

**Dosering:** Du må kun bruge Microlax til børn under 3 år efter aftale med en læge. Hos børn under 3 år indføres dog højst den halve længde i endetarmen. Du skal bruge Microlax ca. 15 minutter før, du ønsker, at det skal virke.

**Kontraindikationer:**

- Gastro-intestinal perforation
- Toksisk megacolon

Microlax Bør ikke anvendes til patienter med kendt allergi overfor indholdsstofferne, som lider af blødende eller smertende hæmoroider, betændelse i tarmen eller ved akutte mave-tarm problemer. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmiddel. Behandlingen bør ophøre ved blødning fra endetarmen eller længerevarende manglende tarmbevægelse. Microlax bør kun anvendes dagligt i korte perioder. Ved overdreven anvendelse kan der opstå behandlingskrævende diarré og væsketab. Hyppig eller gentagen brug af et afføringsmiddel i mere end en uge, kan medføre afhængighed.

**Advarsler og forsigtighedsregler:**

Får du blødning fra endetarmen eller manglende tarmbevægelse efter brug af Microlax kan årsagen være af alvorlig karakter. Stop med at tage Microlax og tal med din læge.

Microlax bør ikke anvendes til børn under 2 uden samråd med læge. Bør anvendes med forsigtighed til børn under 3 år.

# PRODUKTDATABLAD

## Microlax

<b>Opbevaring:</b>	Opbevar Microlax utilgængeligt for børn og ved almindelig temperatur
<b>Holdbarhed:</b>	Se holdbarhedsdato på emballagen.
<b>Håndtering og destruktio</b>	Medicinrester skal afleveres på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7540091	Microlax	Håndkøbsmedicin rectalvæske 5ml HF	5 ml	Æske a 50 stk.-krt. a 600 stk.	016622

#### ANSVARLIGT Producent

**Famar Orléans**, 5 Avenue de Concyr, 45071  
Orléans Cedex 2, Frankrig.